

# Musaraignes et petits rongeurs : Attention risque de confusion !

Les musaraignes sont des insectivores (larves d'insectes, pucerons, limaces...). Elles ne s'attaquent donc pas à vos légumes. Prédateurs hors pair à leur échelle, elles consomment à l'occasion les jeunes campagnols au nid.

- Musaraignes**
- Yeux minuscules
  - Nez pointu et mobile
  - Petites oreilles

- Sorex**
- Yeux minuscules
  - Oreilles cachées dans le pelage
  - Pointe des dents rouge

- Crocidures**
- Yeux + grands
  - Oreilles + grandes et sortant légèrement du pelage
  - Longs poils isolés sur la queue
  - Dents entièrement blanches

## Musaraigne couronnée

*Sorex coronatus - Minoc'h Millet*

Pelage tricolore : dos sombre, flancs fauves, ventre clair



## Musaraigne pygmée

*Sorex minutus - Minoc'h korrik*

Pelage + uniforme (démarcation + floue)



Queue + longue (3/4 de la longueur tête + corps) et + épaisse

Il existe en Bretagne deux autres espèces de musaraignes :

- La Musaraigne des jardins (*Crocidura suaveolens - Minell al liorzhou*), très rare en Bretagne (îlots et très localement dans le sud-est de la région)
- La Musaraigne aquatique (*Neomys fodiens - Minoc'h-dour*), spécifique des milieux aquatiques.

## Crocidure musette


*Crocidura russula - Minell an tiez*

+ courante !

Pelage gris-brun ≈ uniforme

Pelage + clair sur le ventre que sur le dos

Pas de démarcation nette




Pieds sombres

## Crocidure leucode

*Crocidura leucodon - Minell daouilv*

Pelage bicolore : dos sombre, ventre blanc

Démarcation nette dos / ventre



## Petits rongeurs


En général, ce sont les campagnols qui font des dégâts au jardin. Leurs galeries, nombreuses et plus ou moins superficielles, sont facilement repérables. Le Mulot établit ses terriers dans des endroits plus discrets (chaies, talus, troussailles...).

- Campagnols**
- Queue courte
  - Petits yeux
  - Petites oreilles
  - Museau court et arrondi

- Mulots et souris**
- Longue queue (≈ longueur tête + corps)
  - Grands yeux
  - Grandes oreilles

## Campagnol roussâtre

*Myodes glareolus - Muenn arrous*




- Queue + courte
- Oreilles + petites

5 soles plantaires\*

## Campagnol souterrain


*Microtus subterraneus - Muenn zouar*



Très localement (sud-est de la Région) : présence d'une autre espèce, très difficile à distinguer : le Campagnol de Gerbe (*Microtus gerbei*)


## Campagnol des champs

*Microtus arvalis - Muenn ar parkeier*



## Campagnol agreste


*Microtus agrestis - Muenn ar maeziou*



\* Callosités sur la plante des pieds

## Souris grise

*Mus musculus - Logod ti*



En Bretagne, il existe un autre petit rongeur de la famille des souris, le Rat des moissons, qui vit dans les hautes herbes.

6 soles plantaires\*

Mulot dans les bâtiments

